ОСНОВНА ЛИСТА – ЛИСТА А

АТС	INN	Облик лијека	Доза
А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ			
А03 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ			
А03F - ПРОПУЛЗИВИ			
А03FА01	метоклопрамид[1]	таблете	10 mg
		орални раствор	5mg/5ml
ИНДИКАЦИЈЕ	1 – За пацијенте обољеле од малигних обољења (С00-С97).		
А07 – АНТИДИЈАРОИЦИ И ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ / АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ			
А07А – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЕКТИВИ			
А07АА02	нистатин	прашак за оралну суспензију	100 000 i.j./ml
		обложене таблете	500 000 i.j.
А07АХ03	нифуроксазид[2]	суспензија капсуле	200mg/5 ml 200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	2 – Само за дјецу до 15 година		
А07Е – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ			
А07ЕС01	сулфасалазин	гастрорезистентне таблете	500 mg
А07ЕС02	месалазин	таблете са продуженим ослобађањем[3]	500 mg
		супозиторије[4]	500 mg
		ректална суспензија[5]	4g/60ml
ИНДИКАЦИЈЕ	3 – Chron-ова болест (К50), Улцерозни колитис. 4 – Улцерозни проктитис (К51.2). 5 – Акутна фаза улцерозног колитиса.		
А09 – ДИГЕСТИВИ УКЉУЧУЈУЋИ ЕНЗИМЕ			
А09А – ДИГЕСТИВИ, УКЉУЧУЈУЋЕ ЕНЗИМЕ			
А09АА02	липаза,амилаза,протеаза [6]	капсуле	(25 000 + 18 000 + 1000) i.j.
ИНДИКАЦИЈЕ	6 – Цистична фиброза (Е84).		
А10 – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕСА)			
А10А – ИНСУЛИНИ И АНАЛОЗИ			
А10АВ01	инсулин, хумани[7]	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	7 - Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога.		
А10АВ04	инсулин лиспро[8]	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
А10АВ05	инсулин аспарт[8]	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
А10АВ06	инсулин глулисин[8]	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	8 - а)Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на интензивираној терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c >7%) у којих се уводи интензивирана терапија инсулинским аналозима (4-5 доза дневно, комбинација краткодјелујућег и дугодјелујућег, односно бифазног аналога, који су уведени у терапију у складу са њима		

	прописаним индикацијама) или за пацијенте на терапији дугодјелујућим, односно бифазним аналогом као додатна терапија у случају перзистирања понављане постпрандијалне хипергликемије (гликемија већа од 9 mmol/l, 2 сата послије оброка) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. Б) Само за пацијенте до 18 година и труднице, као прва линија терапије. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.		
A10AC01	инсулин, хумани[9]	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
A10AD01	инсулин, хумани[9]	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	9 – Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога.		
A10AD04	инсулин лиспро[10]	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
A10AD05	инсулин аспарт[10]	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	10 - Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c >7%) у којих перзистирају понављане постпрандијалне хипергликемије (гликемија већа од 9 mmol/l, 2 сата послије оброка) или понављане хипогликемије (гликемија мања од 3,5 mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.		
A10AE04	инсулин гларгин[11]	раствор за инјекцију	100 i.j./ml, 300 i.j./ml
A10AE05	инсулин детемир[11]	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
A10AE06	инсулин деглудек[11]	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	11 - а)Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c >7%) у којих перзистирају понављане хипогликемије (гликемија мања од 3,5 mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. Б)Само за пацијенте до 18 година и труднице, као прва линија терапије. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност		

	напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.		
A10AE54	инсулин гларгин, ликсисенатид[12]	раствор за инјекцију	100јединица/ml+33mcg/ml 100јединица/ml+50mcg/ml
A10AE56	инсулин деглудек, лираглутид[12]	раствор за инјекцију	100i.j./ml+3,6mg/ml
ИНДИКАЦИЈЕ	12 – За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном гликемијом након примјене комбиноване терапије максималне дозе оралним антидијабетицима и инсулином или комбиноване терапије маскималне дозе оралним антидијабетицима и агониста GLP-1 рецептора који не успијевају постићи HbA1c<7%, те који уз то имају индекс тјелесне масе ≥ 30kg/m^2. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална инсулинска терапија) искључити краткодјелујући инсулински препарат. Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након шестомјесечног лијечења потребно је процијенити учинак лијечења, а наставак лијечења могућ је искључиво уколико постоји позитиван одговор на лијечење (смањење HbA1c за најмање 0,5% и губитак на тјелесној тежини од 5%)“.		
НАПОМЕНА	Хипогликемијска, односно постпрандијална хипергликемијска епизода утврђује се на један од сљедећих начина: - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемјске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен апаратом за самоконтролу гликемије (меморија личног апарата) и верификован налазом у картону пацијента односно специјалистичком налазу на основу кога се лијек уводи у терапију; - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске епизоде утврђен апаратом за самоконтролу од стране доктора хитне помоћи у чијем се присуству догодила хипогликемјска епизода и верификован у његовом налазу; - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемјске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен у здравственој установи и верификован налазом у картону пацијента односно специјалистичком налазу на основу кога се лијек уводи у терапију.		
A10B – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ИНСУЛИНЕ			
A10BA02	метформин	филм – таблете	500 mg; 850 mg;1000mg
		таблете са продуженим ослобађањем	500mg; 750mg; 1000mg
A10BB09	гликлазид	таблете	80 mg
A10BJ02	лираглутидум[13]	раствор за инјекцију	6 mg/ml
A10BJ03	ликсисенатид[13]	раствор за инјекцију	10mcg/дози

			20mcg/дози
A10BJ05	дулаглутид[13]	раствор за инјекцију	0,75mg/0,5ml 1,5mg/0,5ml
A10BJ06	семаглутид[13]	раствор за инјекцију	0,25mg/дози 0,5mg/дози 1mg/дози
ИНДИКАЦИЈЕ	13 – За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном гликемијом, након примјене максималних доза два орална антидијабетика или комбиноване терапије оралним антидијабетицима и инзулином, који не успијевају постићи HbA1c<7%, те који уз то имају индекс тјелесне масе ≥ 30kg/m^2. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална инсулинска терапија) искључити краткодјелујући инсулински препарат. Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након шестомјесечног лијечења потребно је процијенити учинак лијечења, а наставак лијечења могућ је искључиво уколико постоји позитиван одговор на лијечење (смањење HbA1c за најмање 0,5% и губитак на тјелесној тежини од 5%).		
A11 – ВИТАМИНИ			
A11C – ВИТАМИН А, ВИТАМИН D, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ			
A11CC03	алфакалцидол [14]	меке капсуле	0,25 mcg
A11CC05	холекалциферол [15]	оралне капи, раствор	4000 i.j./ml 14400 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	14 – Само за пацијенте са тешком бубрежном инсуфицијенцијом (N18) 15 - Само за дјецу до 5 година		
B – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ **B01 – АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)**			
B01A – АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)			
B01AA03	варфарин	таблете	5 mg
B01AA07	аценокумарол	таблете	4 mg
B01AB04	далтепарин[16]	раствор за инјекцију	2500 i.j./0,2ml
			5000 i.j./0,2ml
B01AB05	еноксапарин[16]	раствор за инјекцију	20 mg/0,2ml
			40 mg/0,4ml
			60 mg/0,6ml
			80 mg/0,8ml
B01AC04	клопидогрел[17]	филм- таблете	75 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	16 – Наставак болничког лијечења 17 – Након акутног коронарног синдрома (I21-I24), након балон дилатације и уградње стента (Z95) на препоруку специјалисте кардиолога уз ограничење до 6 мјесеци		
B02 – АНТИХЕМОРАГИЦИ			
B02B – ВИТАМИН К И ДРУГИ ХЕМОСТАТИЦИ			
B02BD02	хумани фактор коагулације VIII[18], туроктоког алфа [18]	прашак и растварач за раствор за	500 i.j.; 1000 i.j.

		инјекцију/ инфузију	
B02BD04	хумани фактор коагулације IX [18]	прашак и растварач за раствор за инјекцију/ инфузију	500 i.j.; 1000 i.j.
ИНДИКАЦИЈЕ	18 – Само на препоруку специјалисте хематолога / педијатра		
B03 – АНТИАНЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ АНЕМИЈЕ)			
B03A – ПРЕПАРАТИ ГВОЖЂА			
B03AA02	гвожђе (II) – фумарат	капсуле	350 mg
B03AB05	декстриферон[19]	орални раствор	50 mg/ml
B03AB09	гвожђе (III)-протеинсукцинилат[19]	орални раствор	80 mg/15ml
ИНДИКАЦИЈЕ	19 - Само за дјецу до 15 година и труднице		
C – КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ			
C01 – ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ СРЦА			
C01A – СРЧАНИ ГЛИКОЗИДИ			
C01AA05	дигоксин	таблете	0,25 mg
C01B – АНТИАРИТМИЦИ, ГРУПА I и III			
C01BC03	пропафенон [20]	филм – таблете	150 mg; 300 mg
C01D – ВАЗОДИЛАТАТОРИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА			
C01DA02	глицерил тринитрат	сублингвални спреј, раствор	0,4 mg/дози
C01DA14	изосорбид мононитрат	таблете	20 mg; 40 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	20 – По препоруци кардилога или интернисте		
C02 – АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ			
C02A – АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ЦЕНТРАЛНОГ ДЈЕЛОВАЊА			
C02AB01	метилдопа [21]	филм-таблете	250 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	21 – Артеријска хипертензија у трудноћи (O10-O16)		
C03 – ДИУРЕТИЦИ			
C03A – СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ			
C03AA03	хидрохлоротиазид	таблете	25 mg
C03D – ДИУРЕТИЦИ КОЈИ ШТЕДЕ КАЛИЈУМ			
C03DA01	спиронолактон[22]	таблете	25 mg; 100 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	22 – Срчана инсуфицијенција (I50)		
C07 – БЛОКАТОРИ БЕТА – АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА			
C07A – БЛОКАТОРИ БЕТА – АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА			
C07AA05	пропранолол	таблете	40 mg
C07AB03	атенолол	филм-таблете	50 mg; 100 mg
		таблете	100 mg
C08 – БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА			
C08C – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ПРЕТЕЖНО ВАСКУЛАРНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ			
C08CA05	нифедипин	филм-таблете	20 mg
		таблете са продуженим ослобађањем	20 mg
		филм-таблете са	20 mg

		продуженим ослобађањем	
C08D – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА СРЦЕ			
C08DA01	верапамил	филм-таблете	40 mg; 80 mg
C09 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН СИСТЕМ			
C09A – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕНТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА (ACE), МОНОКОМПОНЕНТНИ			
C09AA02	еналаприл	таблете	10 mg; 20mg
C09AA05	рамиприл	таблете	5 mg; 10mg
C09AA06	квинаприл	филм-таблете	10 mg; 20mg
C09B – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕНТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА (ACE), КОМБИНАЦИЈЕ			
C09BA02	еналаприл, хидрохлоротиазид	таблете	(10+12,5)mg (10+25)mg (20+12,5)mg
D – КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО			
D07 – КОРТИКОСТЕРОИДИ, ДЕРМАТОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ			
D07A - КОРТИКОСТЕРОИДИ, МОНОКОМПОНЕНТНИ			
D07AB10	алклометазон	крем; маст	0,5mg/g
D07X – КОРТИКОСТЕРОИДИ, ОСТАЛЕ КОМБИНАЦИЈЕ			
D07XC01	бетаметазон, салицилна киселина [23]	маст	(0,5 + 30,0) mg/g
ИНДИКАЦИЈЕ	23 – Лијечење псоријазе (L40)		
G – ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ			
G01 – ГИНЕКОЛОШКИ АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ			
G01A – АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА КОРТИКОСТЕРОИДИМА			
G01AF01	метронидазол	вагиторије	500 mg
G03 – ПОЛНИ ХОРМОНИ И МОДУЛАТОРИ ГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА			
G03A – ХОРМОНСКИ КОНТРАЦЕПТИВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
G03AA07	левоноргестрел, етинилестрадиол[24]	филм – таблете	(015+0,03)mg
ИНДИКАЦИЈЕ	24 – Хормонска контрацепција (Z30) уз препоруку гинеколога или ендокринолога		
G03D – ПРОГЕСТЕРОНИ			
G03DA04	прогестерон[25]	капсула, мека	100 mg
G03DB01	дидрогестерон[25]	филм-таблете	10 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	25 - Пријетећи побачај. Превенција понављаних побачаја узрокованих недовољним лучењем прогестерона. Опасност од пријевременог порођаја. У поступку процедуре вантјелесне оплодње. Лијек се уводи у терапију по препоруци гинеколога.		
G03H – АНТИАНДРОГЕНИ			
G03HA01	ципротерон [26]	таблете	50 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	26- Иноперабилни карцином простате (C61), на основу мишљења онколога или уролога или ендокринолога.		

Н – ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНСУЛИНЕ			
Н01 – ХОРМОНИ ХИПОФИЗЕ И ХИПОТАЛАМУСА И АНАЛОЗИ			
Н01А – ХОРМОНИ ПРЕДЊЕГ РЕЖЊА ХИПОФИЗЕ И АНАЛОЗИ			
Н01АС01	соматропин [27]	инјекција, прашак и растварач за раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом пену	5 mg/1,5ml;10 mg/1,5ml; 5,3mg/ml; 12mg/ml
Н01В – ХОРМОНИ ЗАДЊЕГ РЕЖЊА ХИПОФИЗЕ			
Н01ВА02	дезмопресин	таблете	0,2 mg
		спреј за нос	10 mcg /0,1ml
ИНДИКАЦИЈЕ	27 – Хипопитуитаризам (Е23.0). - Турнеров синдром (Q96). - Као супституциона терапија код младих особа са урођеним или стеченим дефицитом хормона раста.		
Н02 – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
Н02А – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, МОНОКОМПОНЕНТНИ			
Н02АВ07	преднизон	таблете	5 mg; 20 mg
Н02АВ09	хидрокортизон [28]	таблете	10mg; 20 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	28 – Sheehanov синдром (Е23), Morbus Adison (Е27.1).		
Н03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ТИРЕОИДЕЈЕ (ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ)			
Н03А – ПРЕПАРАТИ ТИРЕОИДЕЈЕ			
Н03АА01	левотироксин – натријум	таблете	0,100 mg
Н03В – АНТИТИРЕОИДНИ ЛИЈЕКОВИ			
Н03ВА02	пропилтиоурацил[29]	таблете	50 mg; 100 mg
Н03ВВ02	тиамазол	таблете	20 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	29– Хипертиреоза у трудноћи (О99.2) и хипертиреоза код дојиља		
Н04 – ПАНКРЕАСНИ ХОРМОНИ (ХОРМОНИ ГУШТЕРАЧЕ)			
Н04А – ГЛИКОГЕНОЛИТИЧКИ ХОРМОНИ			
Н04АА01	глукагон	раствор за ињекцију	1 mg (1i.j.)
Н05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ХОМЕОСТАЗЕ КАЛЦИЈУМА			
Н05А – ПАРАТИРОИДНИ ХОРМОНИ И АНАЛОЗИ			
Н05АА02	терипаратид[30]	раствор за инјекцију у улошку	20mcg/80mcl
ИНДИКАЦИЈЕ	30 – Код особа са тешком остеодензитометријски доказаном остеопорозом (BMD преко 3,5). За особе са остеопоротским преломом кичме односно кука потврђеним од стране одговарајућег специјалисте. За секундарну превенцију остеопоротичних прелома код пацијената у постменопаузи које су имале бар један прелом узрокован траумом уз верификовану остеопорозу. Лијек се уводи у терапију по препоруци реуматолога или ендокринолога или ортопеда или физијатра		

	здравствене установе терцијарног нивоа.		
J – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J01 – АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J01A – ТЕТРАЦИКЛИНИ			
J01AA02	доксициклин	капсуле, филм-таблете	100 mg
J01C – БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБИОТИЦИ, ПЕНИЦИЛИНИ			
J01CA04	амоксицилин	капсуле	500 mg
		прашак за оралну суспензију	250 mg/5ml
		прашак за оралну суспензију	100 mg/ml
J01CE10	бензатин-феноксиметилпеницилин	орална суспензија	750 000 i.j./5ml
		филм-таблете	1000 000i.j.; 1500 000i.j.
J01D – ОСТАЛИ БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ			
J01DB01	цефалексин	капсуле	500 mg
		прашак за оралну суспензију	250 mg/5ml
J01E – СУЛФОНАМИДИ И ТРИМЕТОПРИМ			
J01EE01	сулфаметоксазол,триметоприм	таблете	400 mg + 80 mg
		сируп	(200 + 40) mg/5ml
J01F – МАКРОЛИДИ, ЛИНКОЗАМИДИ И СТРЕПТОГАМИНИ			
J01FA01	еритромицин	филм-таблете, прашак за оралну суспензију	500 mg, 250 mg/5ml
J02 – АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J02A – АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J02AC01	флуконазол [31]	капсуле	50 mg; 100 mg; 150 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	31 – Наставак болничког лијечења уз ограничење примјене до 21 дан		
J05 – АНТИВИРУСНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J05A – ЛИЈЕКОВИ СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА ВИРУСЕ			
J05AB01	ацикловир[32]	таблете	200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	32 – За пацијенте који су имунодефицијентни уз индикацију: карцином (C00-C97), хепатитис (B15-B19), HIV/AIDS (B20-B24); за пацијенте који су на терапији кортикостероидима дуже од мјесец дана		
J05AF05	ламивудин[33]	филм-таблете	100 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	33 – Хронични хепатитис Б (B18.1)		
L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ			
L01 – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ			
L01B – АНТИМЕТАБОЛИТИ			
L01BA01	метотрексат	таблете	2,5 mg
L02 – ЕНДОКРИНОЛОШКА ТЕРАПИЈА			
L02B – ХОРМОНСКИ АНТАГОНИСТИ И СРОДНИ ЛИЈЕКОВИ			
L02BA01	тамоксифен	таблете	10 mg
L02BB03	бикалутамид [34]	филм-таблете	50 mg

ИНДИКАЦИЈЕ	34 – Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (C61) уз препоруку специјалисте онколога.		
L02BG03	анастрозол [35]	филм-таблете	1 mg
L02BG06	ексеместан [35]	обложене таблете	25 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	35– Лијечење хормонски зависног метастатског карцинома дојке (C50) након неуспјеха терапије са тамоксифеном или контраиндикације за тамоксифен код постменопаузалних жена уз препоруку специјалисте онколога.		
L02BG04	летрозол	таблете	2,5 mg
L04 – ИМУНОСУПРЕСИВИ L04A – ИМУНОСУПРЕСИВИ			
L04AA01	циклоспорин [36]	капсуле	25 mg; 50 mg; 100 mg
		орални раствор	100 mg/ml, 50 ml
L04AA05	такролимус [36]	капсуле	0,5mg; 1 mg; 5 mg
		тврда капсула са продуженим ослобађањем	0,5mg; 1 mg;3mg; 5 mg
		таблете са продуженим ослобађањем	0,75mg; 1mg; 4mg
L04AA06	микофенолат мофетил [36]	капсуле	250 mg
L04AA06	микофенолна киселина [36]	гастрорезистентне таблете	180 mg; 360mg
L04AX01	азатиоприн [36]	таблете,филм-таблете	50 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	36 – Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција(N18), трансплантација (Z94).		
M – МИШИЋНО – КОШТАНИ СИСТЕМ			
M01 – АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ			
M01A – НЕСТЕРОИДНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ			
M01AE01	ибупрофен	сируп [37]	100 mg/5ml
		филм-таблете,дражеје	400 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	37 – За дјецу и лица са поремећеним актом гутања		
M04 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА			
M04A – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА			
M04AA01	алопуринол	таблете	100 mg
N – НЕРВНИ СИСТЕМ			
N02 – АНАЛГЕТИЦИ			
N02A – ОПИОИДИ			
N02AA01	морфин[38]	сируп	10mg/5ml
		оралне капи	20mg/ml
N02AA55	оксикодон, налоксон[39]	таблете са	2,5mg+5mg

		продуженим ослобађањем	5mg+10mg 10mg+20mg 20mg+40mg
N02AB03	фентанил [38]	трансдермални фластер	50 mcg/h(8,4mg/21 cm^2, 5mg/20 cm^2)
			25 mcg/h(4,2mg/10,5cm^2, 2,5mg/10 cm^2)
			100 mcg/h(23,12mg/42 cm^2, 10mg/ 40 cm^2)
N02AE01	бупренорфин[38]	трансдермални фластер	35 mcg/h
			52,5 mcg/h
			70 mcg/h
N02AX02	трамадол[38]	капсуле	50 mg
		филм-таблете	100 mg
		оралне капи,раствор	100 mg/ml
		таблете са модификованим ослобађањем	100 mg
N02B – ОСТАЛИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТИПИРЕТИЦИ			
N02BE01	парацетамол	сируп	120 mg/5ml
		супозиторије	200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	38 – За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв. Трећој аналгетичкој степеници (C00 – C97) на препоруку специјалисте онколога. Након што су исцрпљене друге фармакотерапијске могућности у лијечењу бола, а на препоруку специјалисте неуролога или анестезиолога, у терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична неуралгија)(M79.2), постхерпетичке неуралгије(G53.0), тригеминалне неуралгије(G50.0) диабетичке амиотрофије (G73.0), болних поремећаја оптичког нерва(H47.0), каузалгије(G56.4),спондилодисцитиса (M50.1 и M51.1),дерматополиомиозитиса(M33.0) и посттрауматске неуралгије. 39 - За лијечење умјерено јаког до јаког хроничног бола код болесника са малигним обољењем (C00-C97) на препоруку онколога.		
N03 – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ			
N03A - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ			
N03AA02	фенобарбитон	таблете	100 mg
N03AE01	клоназепам	таблете	0,5mg; 2 mg
N03AF01	карбамазепин	таблете	200 mg
		таблете са продуженим ослобађањем	400 mg
N03AF02	окскарбамазепин	орална суспензија	60 mg/ml
		филм-таблете	300 mg; 600 mg
N03AG01	натријум – валпроат	таблете са продуженим ослобађањем	300 mg; 500 mg
N03AG01	натријум-валпроат	гастрорезистентне таблете	150mg; 300 mg
		оралне капи, раствор	300mg/ml
N03AX09	ламотригин	таблете	25 mg;50 mg;100 mg

		таблете за жвакање	5 mg
N03AX11	топирамат [40]	таблете	25 mg;50 mg;100 mg
N03AX14	леветирацетам[41]	филм-таблете	250 mg;500 mg; 1000 mg
		орални раствор	100mg/1ml
ИНДИКАЦИЈЕ	40 – За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или неуролога/неуропсихијатра. 41 – Епилепсија (G40).		
N04 – АНТИПАРКИНСОНИЦИ N04A – АНТИХОЛИНЕРГИЦИ			
N04AA02	бипериден	таблете	2 mg
N04B – ДОПАМИНЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ			
N04BA02	леводопа, бензеразид	таблете	100 mg + 25 mg
N04BC01	бромокриптин	таблете	2,5 mg
N04BC04	ропинирол[42]	филм-таблете	0,25mg;1mg;2mg
		таблете са продуженим ослобађањем	2 mg; 4 mg; 8 mg
N04BC05	прамипексол[42]	таблете	0,18mg; 0,7mg
		таблете са продуженим ослобађањем	0,26mg; 0,52mg; 1,05mg
ИНДИКАЦИЈЕ	42 – Само за лијечење узнапредовалог стадијума Паркинсонове болести (G20), по препоруци неуролога		
N05 – ПСИХОЛЕПТИЦИ			
N05A – АНТИПСИХОТИЦИ			
N05AA01	хлоропромазин	таблете	25 mg
N05AB02	флуфеназин	обложене таблете	2,5 mg; 5 mg
N05AD01	халоперидол	таблете	2 mg; 10 mg
N05AH02	клозапин	таблете	25 mg; 100 mg
N05AH03	оланзапин	филм-таблете, распадљиве таблете за уста	5 mg; 10 mg
N05B – АНКСИОЛИТИЦИ			
N05BA01	диазепам [43]	таблете	10 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	43 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29)		
N05BA12	алпразолам	таблете	0,5mg; 1mg
N06 – ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ			
N06A – АНТИДЕПРЕСИВИ			
N06AA09	амитриптилин	филм-таблете	10 mg; 25 mg
N06AA21	мапротилин	филм-таблете	25 mg
N07 – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ			
N07B – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ			
N07BC01	бупренорфин[44]	сублингвалне таблете	2mg; 8mg
N07BC02	метадон [44]	оралне капи,раствор	10 mg/ml
		таблете	5 mg
N07BC51	бупренорфин, налоксон[44]	сублингвалне	(2+0,5)mg

		таблете	(8+2)mg
ИНДИКАЦИЈЕ	44 - За супституцијску терапију зависника од опојних дрога (F11), на препоруку специјалисте психијатра из здравствених установа које су одређене посебним актом директора Фонда.		
P – АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ			
P01 – АНТИПРОТОЗОИЦИ P01A – АМЕБИЦИДИ И ДРУГИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ СУ ИЗАЗВАНЕ ПРОТОЗОАМА			
P01AB01	метронидазол	филм-таблете	400 mg
		таблете	250 mg
P02 – АНТИХЕЛМИНТИЦИ			
P02C – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ НЕМАТОДА			
P02CA01	мебендазол	орална суспензија	100 mg/5ml
R – РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ			
R03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ			
R03A – АДРЕНЕРГИЦИ, ИНХАЛАЦИОНИ			
R03AC02	салбутамол	инхалациони раствор за распршивач	5 mg/ml
		инхалациона суспензија за распршивач	100 mcg/доза
R03AC13	формотерол[45]	прашак за инхалирање, тврда капсула	12 mcg/1 капсула
R03AC18	индакатерол[45]	прашак за инхалацију, тврда капсула	150 mcg
R03AK04	беклометазон, салбутамол[46]	стлачени инхалат, суспензија	(250+100)mcg/1 доза
R03AK06	салметерол, флутиказон[46,47]	инахалациона суспензија за распршивач	(25 + 250) mcg/1 доза (25 + 125) mcg/1 доза (25 + 50) mcg/1 доза
		прашак за инхалацију	(50 + 250) mcg/1 доза (50 + 100) mcg/1 доза (50 + 500) mcg/1 доза
R03AK08	беклометазон, формотерол[46,47]	стлачени инхалат, раствор	(100+6) mcg/инхалацији
R03AK07	будесонид, формотерол[46,47]	прашак инхалата	(160+4,5) mcg/дози
			(320+9) mcg/дози
R03AK10	флутиказон фуроат, вилантерол	прашак за инхалацију, подијељени	92/22 mcg[46,47]
			184/22 mcg[46]
R03AK11	флутиказон, формотерол[46]	суспензија за инхалирање под притиском	50mcg/1доза +5mcg/1доза
			125mcg/1доза+5mcg/1доза
R03AK14	индакатерол, мометазон[46]	прашак за инхалацију, тврда капсула	125mcg/1капсула+127,5mcg/1капсула
R03AL04	индакатерол, гликопиронијум	прашак за	(85+43) mcg/дози

	бромид[45]	инхалацију, тврда капсула	
R03AL09	беклометазон, формотерол, гликопиронијум бромид[48]	стлачени инхалат, отопина	(87+5+9) mcg/дози
ИНДИКАЦИЈЕ	45 –ХОПБ (J44) 46 – Астма (J45) 47 - Стадијум Ц ХОПБ (J44), Стадијум Д ХОПБ (J44) 48 - Код одраслих болесника са умјереним до тешким обликом ХОПБ (J44)		
R03B – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ, ИНХАЛАЦИОНИ			
R03BA05	флутиказон	инхалациона суспензија за распршивач	50 mcg/1 доза 125 mcg/1 доза 250 mcg/1 доза
R03BB04	тиотропијум[49]	прашак за инхалацију у тврдој капсули	0,018 mg
		раствор за инхалацију	2,5mcg/дози
		прашак за инхалацију у тврдој капсули	10mcg/дози
R03BB05	аклидинијум[49]	прашак за инхалацију	322mcg/дози
R03BB06	гликопиронијум бромид[49]	прашак за инхалацију, тврда капсула	44 mcg
ИНДИКАЦИЈА	49 – ХОПБ (J44)		
R03C – АДРЕНЕРГИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
R03CC02	салбутамол	сируп	2 mg/5ml
		таблете	2 mg
R03D – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ У ТЕРАПИЈИ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ			
R03DA05	аминофилин	таблете са продуженим ослобађањем	350 mg
		таблете	100 mg
R05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ КАШЉА И ПРЕХЛАДЕ			
R05C – ЕКСПЕКТОРАНСИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА АНТИТУСИЦИМА			
R05CB13	дорназа алфа[50]	раствор за распршивање	1mg/1ml
ИНДИКАЦИЈА	50 – Цистична фиброза (E48)		
R06 – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
R06A – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
R06AX13	лоратадин [51]	сируп	5 mg/5ml
R06AX27	дескорратадин [52]	сируп	0,5 mg/ml
ИНДИКАЦИЈЕ	51 – За дјецу до 15 година и особе са поремећеним актом гутања. 52 – Хронични ринитис, назофарингитис и фарингитис (J31) за дјецу до 15 година и особе са поремећеним актом гутања		
S – СЕНЗОРНИ ОРГАНИ			
S01 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ОКА			

S01B – АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ			
S01BA04	преднизолон	капи за очи, суспензија	5 mg/ml
S01C – АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ И АНТИИНФЕКТИВИ У КОМБИНАЦИЈИ			
S01CA01	дексаметазон,неомицин	капи за очи и уши	(1,0 + 3,5) mg/ml
S01E – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГЛАУКОМА И МИОТИЦИ			
S01EC04	бринзоламид	капи за очи	1%
S01ED01	тимолол	капи за очи,раствор	5 mg/ml
V - ОСТАЛО			
V06 – ОПШТИ НУТРИЕНТИ			
V06AC01	дијететски препарат(PAM I,II,III)	прашак	
V06DX02	безглутенско брашно[53]		
V06DX01	дијететски препарат [54]	прашак, течност	
V06DX03	дијететски препарат за ентералну примјену[55]	течност	
V06DX	дијететски препарат – храна за посебне медицинске намјене[56]	прах	
ИНДИКАЦИЈЕ	53 – Целијакија (K90.0). 54 – Само за пацијенте обољеле од фенилкетонурије (E70) и хиперамонијемије (E72.2). Глутарна ацидурија. Болест урина мириса јаворовог сирупа (MSUD). 55 – Цистична фиброза (E84). Мукополисахаридоза тип III (E76.3). АЛС (G12.2). Лафорина болест. Pelizeaus – Merzbacher-ова болест. Rett-ов синдром (F84.1). Ментална ретардација X - везана тип 3 (F71.1). Baten-ова болест (E75.4). Глутарна ацидуриа, Edwards-ов синдром. Мукополисахаридоза тип II (Хантеров синдром) – E76.1 56 - Интолеранција протеина крављег млијека. Мултипла алергија на храну. Netherton – ов синдром (Q80.9). По препоруци педијатра.		

ЛИСТА НЕРЕГИСТРОВАНИХ ЛИЈЕКОВА НЕОПХОДНИХ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБОЉЕЊА-
ЛИСТА А1

АТС	INN	Облик лијека	Доза
А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ			
А11 - ВИТАМИНИ			
А11С – ВИТАМИН А, ВИТАМИН Д, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ			
А11СС02	дихидротахистерол[1]	оралне капи	1 mg/ml
		капсуле (перле)	0,500 mg
ИНДИКАЦИЈА	1 – хипопаратиреоидизам (Е20)		
В – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ			
В01 - АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)			
В01А – АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)			
В01АВ06	надропарин[2]	раствор за инјекцију у напуњеној шприци	2580i.j.anti Xa/0,3ml
			3800i.j.anti Xa/0,4ml
			5700i.j.anti Xa/0,6ml
			7600i.j.anti Xa/0,8ml
ИНДИКАЦИЈА	2 – Наставак болничког лијечења		
Ј – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
Ј04 - АНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ			
Ј04А - АНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ			
Ј04АС01	изониазид	таблете	50 mg
Ј04АК01	пиразинамид	таблете	500 mg
Ј04АК02	етамбутол	таблете	400 mg
Ј04АМ02	исониазид, рифампицин	таблете	(75+150)mg
Ј04АМ	исониазид, рифампицин, етамбутол	таблете	(75+150+275)mg
Ј04АМ06	исониазид, рифампицин, етамбутол, пиразинамид	таблете	(75+150+275+400)mg
L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ			
L01 - АНТИНЕОПЛАСТИЦИ			
L01B - АНТИМЕТАБОЛИТИ			
L01BB02	меркаптопурин	таблете	50 mg
L01C – БИЉНИ АЛКАЛОИДИ И ДРУГИ ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ			
L01CB01	етопозид	капсуле	50 mg
L01X – ОСТАЛИ АНТИНЕОПЛАСТИЦИ			
L01XX05	хидроксикарбамид	капсуле	500 mg
L04 - ИМУНОСУПРЕСИВИ			
L04A - ИМУНОСУПРЕСИВИ			
L04AA10	сиролимус [3]	таблете	1 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	3 – Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција (N18), трансплантација органа (Z94).		

М – МИШИЋНО – КОШТАНИ СИСТЕМ			
М01 – АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ			
М01С – СПЕЦИФИЧНИ АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ			
М01СС01	пеницилaмин	филм-таблете	150 mg; 300 mg
		капсуле	250 mg
М04 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА			
М04А – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА			
М04АА01	алопуринол	таблете	300 mg
N – НЕРВНИ СИСТЕМ			
N03 – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ			
N03A – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ			
N03AF01	карбамазепин	сируп	100 mg/5ml
N03AG01	валпроинска киселина	сируп	300 mg/5ml
N03AG04	вигабатрин [4]	пулвис	500 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	4 – За болеснике са епилепсијом (G40) рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или неролога/неуропсихијатра.		
N04 – АНТИПАРКИНСОНИЦИ			
N04B – ДОПАМИНЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ			
N04BA02	леводопа,бензеразид	капсуле	100 mg + 25 mg
N05 - ПСИХОЛЕПТИЦИ			
N05B - АНКСИОЛИТИЦИ			
N05BA09	клобазам [5]	таблете	10 mg; 20 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	5 – Као помоћна терапија у лијечењу епилепсије (G40), по препоруци педијатра или неуролога.		
N05BA01	диазепам [6]	микроклизма	2,5 ml/5 mg
			2,5 ml/ 10 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	6 – По препоруци педијатра или неуролога.		
N07 – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ			
N07A - ПАРАСИМПАТОМИМЕТИЦИ			
N07AA02	пиридостигмин	дражеје	60 mg
Р – АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ			
Р03 – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ ЕКТОПАРАЗИТА, УКЉУЧУЈУЋИ И СКАБИЦИДЕ ИНСЕКТИЦИДЕ И РЕПЕЛЕНТЕ			
Р03А – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ ЕКТОПАРАЗИТА И СКАБИЈЕСА			
Р03АХ01	бензил бензоат	емулзија	25 %

У прегледу А1 додаје се супстанца и индикације и то: „Натријум – бензоат у облику прашка, индикација – хиперамонијемија (Е72.2)“

ЛИСТА Б

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Доплата осигураног лица
А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ				
А02 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ СУ ИЗАЗВАНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕМ АЦИДИТЕТА				
А02В – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПЕПТИЧКОГ УЛКУСА И БОЛЕСТИ ГАСТРОЕЗОФАГУСНОГ РЕФЛУКСА				
А02ВС01	омепразол[1]	капсуле	20 mg	50%
А02ВС02	пантопразол[1]	гастрорезистентне таблете	20 mg; 40 mg	50%
А02ВС03	лансопразол[1]	капсуле	15 mg;30 mg	50%
А02ВС05	есомепразол[1]	гастрорезистентне капсуле	20 mg; 40 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	1 – За ерадикацију Helicobacter pylori инфекције (К22.1; К25; К26; К28) уз ограничење примјене до 14 дана; Након крварења из пептичког улкуса (К25.0; К25.1; К25.2) на препоруку гастроентеролога уз ограничење примјене до 2 мјесеца; Гастроезофагеална рефлуксна болест(К21): 1)на препоруку гастроентеролога или уз мишљење специјалисте абдоминалног хирурга уз налаз горње ендоскопије уз ограничење примјене до 14 дана од успостављања дијагнозе, 2) као наставак терапије након болничког лијечења до 8 дана у току 12 мјесеци			
А07 – АНТИДИЈАРОИЦИ И ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ/АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ				
А07Е – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ				
А07ЕА06	будесонид[2]	капсуле	3 mg	50%
А07ЕС02	месалазин[3]	гастрорезистентне грануле	500mg; 1000mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	2 – Акутна Chron-ова болест благог до умјереног облика код које је захваћен илеум и/или узлазни колон уз ограничење примјене до 8 недјеља у току 12 мјесеци. Колагенозни колитис уз ограничење примјене до 8 недјеља у току 12 мјесеци. 3 - Лијечење акутних епизода и одржавање ремисије улцерозног колитиса.			
А10 – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕСА)				
А10В – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ИНСУЛИНЕ				
А10ВВ01	глибенкламид	таблете	1,75 mg;3,5 mg;5 mg	50%

A10BB12	глимепирид	таблете	2 mg;3mg;4mg	50%
A10BD07	ситаглиптин, метформин[4]	филм - таблете	(50+1000)mg	50%
A10BD08	вилдаглиптин, метформин[4]	филм - таблете	(50+850)mg (50+1000)mg	50%
A10BD13	алоглиптин, метформин[4]	филм - таблете	(12,5+850)mg (12,5+1000)mg	50%
A10BH01	ситаглиптин[4]	филм - таблете	100mg	50%
A10BH02	вилдаглиптин[4]	таблете	50mg	50%
A10BH04	алоглиптин[4]	филм - таблете	12,5mg; 25mg	50%
A10BX12	емпаглифлозин[5]	филм - таблете	10mg; 25mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	4 - За додатну терапију стандардним антидијабетицима код гојазних болесника са дијабетесом типа 2 старијих од 18 година и нерегулисаном гликемијом (HbA1c>7,0%), уз препоруку специјалисте ендокринолога. 5 – За лијечење дијабетес мелитуса типа 2 код одраслих особа, када дијета и физичка активност не пружају одговарајућу контролу гликемије, код примјене метформина због неподношљивости, те у комбинацији са другим лијековима за снижавање нивоа глукозе у крви, укључујући инсулин када ти лијекови, уз дијету и физичку активност не пружају одговарајућу контролу гликемије, по препоруци ендокринолога.			
A11 - ВИТАМИНИ				
A11C – ВИТАМИН А, ВИТАМИН Д, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ				
A11CC04	калцитриол	капсуле	0,25 mcg	50%
B – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ				
B01 - АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)				
B01A – АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)				
B01AC22	прасугрел[6]	филм - таблете	5mg; 10mg	50%
B01AC30	клопидогрел, ацетилсалицилна киселина[7]	филм - таблете	(75+100)mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	6 - примјењен истовремено са ацетилсалицилном киселином, индикован је у превенцији атеротромботичких догађаја код одраслих пацијената са акутним коронарним синдромом (нестабилна ангина пекторис, инфаркт миокарда без елевације ST сегмента или инфаркт миокарда са елевацијом ST сегмента код пацијената који се подвргавају примарној или одложеној перкутаној			

	коронарној интервенцији (PCI) на препоруку специјалисте кардиолога уз ограничење примјене до 6 мјесеци. 7 – Превенција секундарног можданог удара и пролазних исхемијских можданих напада (TIA) по препоруци неуролога уз ограничење примјене до 6 мјесеци.			
B01AF01	ривароксабан	филм-таблете	10 mg[8] 15 mg[9] 20 mg[9]	50%
B01AF02	апиксабан	филм-таблете	2,5mg[8,9] 5mg[9]	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	8 – Превенција венске тромбоемболије код великих ортопедских захвата доњих екстремитета уз ограничење примјене до 21 дан. 9 – Секундарна превенција можданог удара према препоруци неуролога из Јединице за мождани удар уз ограничење примјене до 6 мјесеци. Примарна превенција исхемијског можданог удара код пацијената са невалвуларном атријалном фибрилацијом по препоруци кардиолога уз ограничење примјене до 6 мјесеци.			
C – КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ				
C01 – ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ СРЦА				
C01B – АНТИАРИТМИЦИ, ГРУПА I и III				
C01BD01	амиодарон [10]	таблете	200 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	10 – По препоруци кардиолога или интернисте			
C01D – ВАЗОДИЛАТАТОРИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА				
C01DA14	изосорбид мононитрат	капсуле са продуженим ослобађањем	40 mg	50%
		ретард таблете	40 mg	50%
C01E – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА				
C01EB15	триметазидин[11]	таблете са прилагођеним ослобађањем	35mg	50%
		капсула са продуженим ослобађањем	80mg	50%

ИНДИКАЦИЈЕ	11– Angina pectoris (I20) по препоруци кардиолога.			
C02 - АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ				
C02C – АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ПЕРИФЕРНОГ ДЈЕЛОВАЊА				
C02AC05	моксонидин[12]	филм - таблета	0,2mg; 0,4mg	50%
C02CA04	доксазосин	таблете	2mg, 4mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	12 – По препоруци интернисте или кардиолога.			
C03 - ДИУРЕТИЦИ				
C03A – СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ				
C03AB08	метиклотиазид,амилорид	таблете	5 mg + 10 mg	50%
C03C – СНАЖНИ ДИУРЕТИЦИ (ДИУРЕТИЦИ HENLEOVE ПЕТЉЕ)				
C03CA01	фуросемид	таблете	40 mg	50%
			500 mg[13]	50%
C03CA04	торасемид [14]	таблете	5 mg; 10 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	13 – Срчана инсуфицијенција(I50), по препоруци кардиолога. 14 - Срчана инсуфицијенција(I50), NYHA III/IV, по препоруци кардиолога.			
C03E – КОМБИНАЦИЈЕ ДИУРЕТИКА КОЈИ ШТЕДЕ КАЛИЈУМ СА ОСТАЛИМ ДИУРЕТИЦИМА				
C03EA01	хидрохлоротиазид,амилорид	таблете	50 mg + 5 mg	50%
C07 – БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА				
C07A – БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА				
C07AB02	метопролол	таблете	50mg; 100mg;200mg	50%
C07AB07	бисопролол	филм-таблете	5 mg; 10 mg	50%
C07AG02	карведилол [15]	таблете	12,5mg;25mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	15 – Срчана инсуфицијенција (I50)			
C08 – БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА				
C08C – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ПРЕТЕЖНО ВАСКУЛАРНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ				
C08CA01	амлодипин	таблете	5 mg; 10 mg	50%

C08CA09	лацидипин [16]	филм – таблете	2 mg; 4 mg	50%
C08CA13	лерканидипин[17]	филм - таблете	10 mg; 20 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	16 - Само за пацијенте са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом (N18). 17 – Само код пацијената који су имали нежељене ефекте на лијек амлодипин, уз препоруку интернисте.			
C08D – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА СРЦЕ				
C08DB01	дилтиазем	таблете	90 mg	50%
C09 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН СИСТЕМ				
C09A – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕРТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА(ACE), МОНОКОМПОНЕНТНИ				
C09AA01	каптоприл	таблете	12,5mg;25mg;50mg	50%
C09AA03	лизиноприл	таблете	10 mg; 20 mg	50%
C09AA09	фосиноприл	таблете	10 mg; 20 mg	50%
C09AA10	трандолаприл	капсуле	0,5mg;2mg;4mg	50%
C09B – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕРТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА(ACE), КОМБИНАЦИЈЕ				
C09BA03	лизиноприл,хидрохлоротиазид	таблете	10 mg + 12,5 mg 20 mg + 12,5 mg 20 mg + 25 mg	50%
C09BA05	рамиприл,хидрохлоротиазид	таблете	2,5 mg + 12,5 mg 5 mg + 25 mg	50%
C09BA06	квинаприл,хидрохлоротиазид	филм-таблете	20 mg + 12,5 mg	50%
C09BA09	фосиноприл, хидрохлорозиазид	таблете	20 mg+12,5 mg	50%
C09BB02	еналаприл, лерканидипин	филм - таблета	10mg+10mg 20mg+10mg	50%
C09BB03	лизиноприл, амлодипин	таблете	10mg+5mg 20mg+5mg 20mg+10mg	50%
C09BB07	рамиприл, амлодипин	капсуле	2,5 mg+5 mg 5 mg+5 mg 5 mg+10 mg	50%

			10 mg +5 mg 10 mg+10 mg	
C09C – АНТАГОНИСТИ РЕЦЕПТОРА АНГИОТЕНЗИНА II, ЈЕДНОСТАВНИ				
C09CA04	ирбесартан [18]	филм-таблете	150 mg; 300 mg	50%
C09D – АНТАГОНИСТИ РЕЦЕПТОРА АНГИОТЕНЗИНА II, КОМБИНАЦИЈЕ				
C09DA04	ирбесартан, хидрохлоротиазид[18]	филм-таблете	150mg+12,5mg; 300mg+12,5mg	50%
C09DB01	амлодипин, валсартан	филм - таблета	5mg+80mg 5mg+160mg 10mg+160mg	50%
C09DX01	амлодипин, хидрохлоротиазид, валсартан	филм - таблета	5mg+12,5mg+160mg 5mg+25mg+160mg 10mg+12,5mg+160mg	50%
C09DX04	сакубитрил, валсартан[19]	филм - таблете	(24+26)mg (49+51)mg (97+103)mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	18 – Само код пацијената са нежељеним ефектима на АСЕ инхибиторе, по препоруци интернисте. 19 - Код пацијената са симптоматском хроничном срчаном инсуфицијенцијом са редукованом ејекционом фракцијом испод 35% (NYHA II-IV), по препоруци кардиолога.			
C10 – СРЕДСТВА КОЈА СМАЊУЈУ ЛИПИДЕ У СЕРУМУ (ХИПОЛИПЕМИЦИ)				
C10A – СРЕДСТВА КОЈА СМАЊУЈУ ЛИПИДЕ У СЕРУМУ (ХИПОЛИПЕМИЦИ), МОНОКОМПОНЕНТНИ				
C10AA01	симвастатин [20]	филм-таблете	10 mg;20 mg;40 mg	50%
C10AA05	аторвастатин [20]	филм-таблете	10mg;20mg;40mg;80mg	50%
C10AA07	розувастатин [20]	филм-таблете	5mg;10mg;20mg;40mg	50%
C10AB05	фенофибрат[22]	таблета	145mg	50%
C10AX09	езетимиб[21]	таблета	10mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	20 – Секундарна превенција коронарне болести(I20-I25). Diabetes mellitus са хиперлипидемијом (E10-E11). Хронична бубрежна инсуфицијенција (N18). Стање пресађеног органа(Z94) са хиперлипидемијом.			

	21 - Секундарна превенција коронарне болести (I20 – I25). Дијабетес мелитус са хиперлипидемијом (E10 - E11). Хронична бубрежна инсуфицијенција (N18). Присуство имплантата и графтова на срцу и крвним судовима (Z95). Лијек се уводи у терапију по препоруци кардиолога или ендокринолога. 22 - Лијек се уводи у терапију након тромјесечне дијете када триглицериди у крви нису мањи од 4,6mmol/l, по препоруци интернисте или кардиолога**.**			
G – ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ				
G01 – ГИНЕКОЛОШКИ АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ				
G01A – АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА КОРТИКОСТЕРОИДИМА				
G01AA51	нистатин,неомицин,полимиксин б	вагиналне капсуле	100 000i.j. + 35 000i.j. + 35000i.j.	50%
G01AA51	нисататин, нифурател	мека вагинална капсула	200 000i.j.+500 mg	50%
G04 – УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ				
G04B - УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ				
G04BD08	солифенацин	филм-таблете	5mg; 10mg	50%
G04BE08	тадалафил[23]	филм - таблета	5mg	50%
ИНДИКАЦИЈА	23 - Бенигна хиперплазија простате (N40) након што су исцрпљене остале фармакотерапијске могућности. Лијек се уводи у терапију по препоруци уролога.			
G04C – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БЕНИГНЕ ХИПЕРТРОФИЈЕ ПРОСТАТЕ				
G04CA02	тамсулозин[24]	капсуле,филм-таблете	0,4 mg	50%
G04CB01	финастерид [24]	филм-таблете	5 mg	50%
G04CB02	дутастерид [24]	меке капсуле	0,5 mg	50%
G04CA52	дутастерид, тамсулозин [24]	капсуле	(0,5+0,4) mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	24 – Бенигна хипертрофија простате (N40), на препоруку специјалисте уролога.			
H – ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНСУЛИНЕ				
H03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ТИРЕОИДЕЈЕ (ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ)				
H03A – ПРЕПАРАТИ ТИРЕОИДЕЈЕ				
H03AA01	левотироксин натријум	таблете	0,050 mg	50%
J – АНТИИНФЕТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ				
J01 – АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ				

J01M – ХИНОЛОНСКИ АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ				
J01MA06	норфлоксацин	филм-таблете	400 mg	50%
L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ				
L04 - ИМУНОСУПРЕСИВИ				
L04A - ИМУНОСУПРЕСИВИ				
L04AA13	лефлуномид [25]	филм-таблете	20 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	25 - Препорука специјалисте реуматолога ако су исцрпљене остале терапијске могућности.			
M – МИШИЋНО – КОШТАНИ СИСТЕМ				
M05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА КОСТИЈУ				
M05B – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА СТРУКТУРУ И МИНЕРАЛИЗАЦИЈУ КОСТИЈУ				
M05BA04	алендронска киселина [26]	таблете	70 mg	50%
M05BA06	ибандронска киселина [26]	филм-таблете	150 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	26 – Препорука специјалисте ендокринолога, реуматолога, физијатра (лијечење остеопорозе(M80-M82)- T score 2,5 SD на LS кичми или куку, прелом на слабу трауму независно о T score – у).			
N – НЕРВНИ СИСТЕМ				
N03 - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ				
N03A – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ				
N03AX12	габапентин	капсуле	100 mg; 300 mg;400 mg	50%
N05 – ПСИХОЛЕПТИЦИ				
N05A – АНТИПСИХОТИЦИ				
N05AX08	рисперидон[27]	филм-таблете	1mg;2mg;3mg	50%
N05AX12	арипипразол	орално дисперзибилна таблета	10 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	27 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29).			
N05C – ХИПНОТИЦИ И СЕДАТИВИ				
N05CF02	золпидем	филм-таблете	5mg; 10mg	50%

N06 – ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ				
N06A – АНТИДЕПРЕСИВИ				
N06AB03	флуоксетин	таблете,капсуле	20 mg	50%
N06AB05	пароксетин	филм-таблете	20 mg	50%
N06AB06	сертралин	филм-таблете	50 mg; 100 mg	50%
N06D – ЛИЈЕКОВИ У ТЕРАПИЈИ ДЕМЕНЦИЈЕ				
N06DA02	донепезил	орална дисперзибилна таблета	5mg; 10mg	50%
R – РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ				
R01 – НАЗАЛНИ ПРЕПАРАТИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ СЛУЗНИЦЕ НОСА)				
R01A – ДЕКОНГЕСТИВИ И ОСТАЛИ НАЗАЛНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛОКАЛНУ ПРИМЈЕНУ				
R01AD12	флутиказон фуроат[28]	спреј за нос, суспензија	27,5 mcg/дози	50%
R01AD58	азеластин, флутиказон	спреј за нос, суспензија	(125+50)mcg/дози	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	28 – За дјецу до 15 година.			
R05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ КАШЉА И ПРЕХЛАДЕ				
R05D – АНТИТУСИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА ЕКСПЕКТОРАНСИМА				
R05DA04	кодеин [29]	таблете	30 mg	50%
ИНДИКАЦИЈЕ	29 – Супресија надражајног кашља код малигних обољења дисајних путева(C30-C39),по препоруци специјалисте.			
S – СЕНЗОРНИ ОРГАНИ				
S01 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ОКА				
S01A – АНТИИНФЕКТИВИ				
S01AD03	ацикловир	маст за очи	30 mg/g	50%
S01E – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГЛАУКОМА И МИОТИЦИ				
S01EC03	дорзоламид	капи за очи, раствор	20mg/ml	50%
S01ED51	латанопрост, тимолол	капи за очи	(50mcg+5mg)/ml	50%
S01EE01	латанопрост	капи за очи, раствор	50 mcg/2,5 ml	50%
S01EE01	травопрост	капи за очи	40mcg/ml	50%