

ОСНОВНА ЛИСТА – ЛИСТА А

АТС	INN	Облик лијека	Доза
А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ			
А03 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ			
А03F - ПРОПУЛЗИВИ			
А03FA01	метоклопрамид ¹	таблете	10 mg
		орални раствор	5mg/5ml
ИНДИКАЦИЈЕ	1 – За пацијенте обољеле од малигнух обољења (C00-C97).		
А07 – АНТИДИЈАРОИЦИ И ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ / АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ			
А07А – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЕКТИВИ			
А07АА02	нистатин	прашак за оралну суспензију	100 000 i.j./ml
		обложене таблете	500 000 i.j.
А07АХ03	нифуруксазид ²	суспензија капсуле	200mg/5 ml 200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	2 – Само за дјецу до 15 година		
А07Е – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ			
А07ЕС01	сулфасалазин	гастрорезистентне таблете	500 mg
А07ЕС02	месалазин	таблете са продуженим ослобађањем ³	500 mg
		супозиторије ⁴	500 mg
		ректална суспензија ⁵	4g/60ml, 1g/100ml
ИНДИКАЦИЈЕ	3 – Chron-ова болест (K50), Улцерозни колитис. 4 – Улцерозни проктитис (K51.2). 5 – Акутна фаза улцерозног колитиса.		
А09 – ДИГЕСТИВИ УКЉУЧУЈУЋИ ЕНЗИМЕ			
А09А – ДИГЕСТИВИ, УКЉУЧУЈУЋЕ ЕНЗИМЕ			
А09АА02	липаза,амилаза,протеаза ⁶	капсуле	(25 000 + 18 000 + 1000) i.j.
ИНДИКАЦИЈЕ	6 – Цистична фиброза (E84).		
А10 – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕСА)			
А10А – ИНСУЛИНИ И АНАЛОЗИ			
А10АВ01	инсулин, хумани ⁷	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	7 - Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога.		
А10АВ04	инсулин лиспро ⁸	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
А10АВ05	инсулин аспарт ⁸	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
А10АВ06	инсулин глулисин ⁸	раствор за	100 i.j./ml

		инјекцију	
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>8 - а) Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на интензивираој терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c >7%) у којих се уводи интензивирана терапија инсулинским аналозима (4-5 доза дневно, комбинација краткодјелујућег и дугодјелујућег, односно бифазног аналога, који су уведени у терапију у складу са њима прописаним индикацијама) или за пацијенте на терапији дугодјелујућим, односно бифазним аналогом као додатна терапија у случају перзистирања понављане постпрандијалне хипергликемије (гликемија већа од 9 mmol/l, 2 сата послје оброка) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.</p> <p>Б) Само за пацијенте до 18 година и труднице, као прва линија терапије. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.</p>		
A10AC01	инсулин, хумани ⁹	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
A10AD01	инсулин, хумани ⁹	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>9 – Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога.</p>		
A10AD04	инсулин лиспро ¹⁰	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
A10AD05	инсулин аспарт ¹⁰	суспензија за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>10 - Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c >7%) у којих перзистирају понављане постпрандијалне хипергликемије (гликемија већа од 9 mmol/l, 2 сата послје оброка) или понављане хипогликемије (гликемија мања од 3,5 mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.</p>		
A10AE04	инсулин гларгин ¹¹	раствор за инјекцију	100 i.j./ml, 300 i.j./ml
A10AE05	инсулин детемир ¹¹	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
A10AE06	инсулин деглудек ¹¹	раствор за инјекцију	100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>11 - а) Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c >7%) у којих перзистирају понављане хипогликемије (гликемија мања од 3,5 mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на</p>		

	<p>основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.</p> <p>Б)Само за пацијенте до 18 година и труднице, као прва линија терапије. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију.</p>		
A10AE54	инсулин гларгин, ликсисенатид ¹²	раствор за инјекцију	100јединица/ml+33mcg/ml 100јединица/ml+50mcg/ml
A10AE56	инсулин деглудек, лираглутид ¹²	раствор за инјекцију	100i.j./ml+3,6mg/ml
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>12 – За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном гликемијом након примјене комбиноване терапије максималне дозе оралним антидијабетицима и инсулином или комбиноване терапије маскималне дозе оралним антидијабетицима и агониста GLP-1 рецептора који не успијевају постићи HbA1c<7%, те који уз то имају индекс тјелесне масе $\geq 30\text{kg/m}^2$. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална инсулинска терапија) искључити краткодјелујући инсулински препарат. Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након шестомјесечног лијечења потребно је процијенити учинак лијечења, а наставак лијечења могућ је искључиво уколико постоји позитиван одговор на лијечење (смањење HbA1c за најмање 0,5% и губитак на тјелесној тежини од 5%)“.</p>		
НАПОМЕНА	<p>Хипогликемијска, односно постпрандијална хипергликемијска епизода утврђује се на један од сљедећих начина:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен апаратом за самоконтролу гликемије (меморија личног апарата) и верификован налазом у картону пацијента односно специјалистичком налазу на основу кога се лијек уводи у терапију; - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске епизоде утврђен апаратом за самоконтролу од стране доктора хитне помоћи у чијем се присуству догодила хипогликемијска епизода и верификован у његовом налазу; - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен у здравственој установи и верификован налазом у картону пацијента односно специјалистичком налазу на основу кога се лијек уводи у терапију. 		
A10B – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ИНСУЛИНЕ			

A10BA02	метформин	филм – таблете	500 mg; 850 mg; 1000mg
		таблете са продуженим ослобађањем	500mg; 750mg; 1000mg
A10BB09	гликлазид	таблете	80 mg
A10BJ02	лираглутидум ¹³	раствор за инјекцију	6 mg/ml
A10BJ03	ликсисенатид ¹³	раствор за инјекцију	10mcg/доза 20mcg/доза
A10BJ05	дулаглутид ¹³	раствор за инјекцију	0,75mg/0,5ml 1,5mg/0,5ml
A10BJ06	семаглутид ¹³	раствор за инјекцију	0,25mg/доза 0,5mg/доза 1mg/доза

ИНДИКАЦИЈЕ

13 – За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном гликемијом, након примјене максималних доза два орална антидијабетика или комбиноване терапије оралним антидијабетикима и инсулином, који не успијевају постићи HbA1c < 7%, те који уз то имају индекс тјелесне масе $\geq 30 \text{ kg/m}^2$. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална инсулинска терапија) искључити краткодјелујући инсулински препарат. Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након шестомјесечног лијечења потребно је процијенити учинак лијечења, а наставак лијечења могућ је искључиво уколико постоји позитиван одговор на лијечење (смањење HbA1c за најмање 0,5% и губитак на тјелесној тежини од 5%).

A11 – ВИТАМИНИ

A11C – ВИТАМИН А, ВИТАМИН D, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ

A11CC05	холекалциферол ¹⁴	оралне капи, раствор	4000 i.j./ml 14400 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ	14 - Само за дјецу до 5 година		

В – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ

В01 – АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)

В01А – АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)

V01AA03	варфарин	таблете	5 mg
V01AA07	аценокумарол	таблете	4 mg
V01AB04	далтепарин ¹⁵	раствор за инјекцију	2500 i.j./0,2ml 5000 i.j./0,2ml
V01AB05	еноксапарин ¹⁵	раствор за инјекцију	20 mg/0,2ml 40 mg/0,4ml 60 mg/0,6ml 80 mg/0,8ml
V01AB06	надропарин ¹⁵	раствор за инјекцију у напуњеном шприцу	2580 i.j./0,3ml 3800 i.j./0,4ml 5700 i.j./0,6ml 7600 i.j./0,8ml

B01AC04	клопидогрел ¹⁶	филм-таблете	75 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	15 – Наставак болничког лијечења 16 – Након акутног коронарног синдрома (I21-I24), након балон дилатације и уградње стента (Z95) на препоруку специјалисте кардиолога уз ограничење до 6 мјесеци		
B02 – АНТИХЕМОРАГИЦИ			
B02B – ВИТАМИН К И ДРУГИ ХЕМОСТАТИЦИ			
B02BD02	хумани фактор коагулације VIII ¹⁷ , туроктоког алфа ¹⁷	прашак и растварач за	500 i.j.; 1000 i.j.
	туроктоког алфа ¹⁷	раствор за	500 i.j.; 1000 i.j.
	мороктоког алфа ¹⁷	инјекцију/	500 i.j.; 1000 i.j.
	симоктоког алфа ¹⁷	инфузију	250 i.j.; 500 i.j.; 1000 i.j.
B02BD04	хумани фактор коагулације IX ¹⁷	прашак и растварач за раствор за инјекцију/ инфузију	500 i.j.; 1000 i.j.
ИНДИКАЦИЈЕ	17 – Само на препоруку специјалисте хематолога / педијатра		
B03 – АНТИАНЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ АНЕМИЈЕ)			
B03A – ПРЕПАРАТИ ГВОЖЂА			
B03AA02	гвожђе (II) – фуларат	капсуле	350 mg
C – КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ			
C01 – ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ СРЦА			
C01A – СРЧАНИ ГЛИКОЗИДИ			
C01AA05	дигоксин	таблете	0,25 mg
C01B – АНТИАРИТМИЦИ, ГРУПА I и III			
C01BC03	пропафенон ¹⁸	филм – таблете	150 mg; 300 mg
C01D – ВАЗОДИЛАТАТОРИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА			
C01DA02	глицерил тринитрат	сублингвални спреј, раствор	0,4 mg/дозе
C01DA14	изосорбид монокитрат	таблете	20 mg; 40 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	18 – По препоруци кардиолога или интернисте		
C02 – АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ			
C02A – АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ЦЕНТРАЛНОГ ДЈЕЛОВАЊА			
C02AB01	метилдопа ¹⁹	филм-таблете	250 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	19 – Артеријска хипертензија у трудноћи (O10-O16)		
C03 – ДИУРЕТИЦИ			
C03A – СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ			
C03AA03	хидрохлоротиазид	таблете	25 mg
C03D – ДИУРЕТИЦИ КОЈИ ШТЕДЕ КАЛИЈУМ			
C03DA01	спиронолактон ²⁰	таблете	25 mg; 100 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	20 – Срчана инсуфицијенција (I50)		
C07 – БЛОКАТОРИ БЕТА – АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА			
C07A – БЛОКАТОРИ БЕТА – АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА			
C07AA05	пропранолол	таблете	40 mg
C07AB03	атенолол	филм-таблете	50 mg; 100 mg
		таблете	100 mg
C08 – БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА			

C08C – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ПРЕТЕЖНО ВАСКУЛАРНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ			
C08CA05	нифедипин	филм-таблете	20 mg
		таблете са продуженим ослобађањем	20 mg
		филм-таблете са продуженим ослобађањем	20 mg
C08D – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА СРЦЕ			
C08DA01	верапамил	филм-таблете	40 mg; 80 mg
C09 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН СИСТЕМ			
C09A – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕНТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА (АСЕ), МОНОКОМПОНЕНТНИ			
C09AA02	еналаприл	таблете	10 mg; 20mg
C09AA05	рамиприл	таблете	5 mg; 10mg
C09B – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕНТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА (АСЕ), КОМБИНАЦИЈЕ			
C09BA02	еналаприл, хидрохлоротиазид	таблете	(10+12,5)mg (10+25)mg (20+12,5)mg
D – КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО			
D07 – КОРТИКОСТЕРОИДИ, ДЕРМАТОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ			
D07A - КОРТИКОСТЕРОИДИ, МОНОКОМПОНЕНТНИ			
D07AB10	алклометазон	крем; маст	0,5mg/g
D07X – КОРТИКОСТЕРОИДИ, ОСТАЛЕ КОМБИНАЦИЈЕ			
D07XC01	бетаметазон, салицилна киселина ²¹	маст	(0,5 + 30,0) mg / g
ИНДИКАЦИЈЕ	21 – Лијечење псоријазе (L40)		
G – ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ			
G01 – ГИНЕКОЛОШКИ АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ			
G01A – АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА КОРТИКОСТЕРОИДИМА			
G01AF01	метронидазол	вагиторије	500 mg
G03 – ПОЛНИ ХОРМОНИ И МОДУЛАТОРИ ГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА			
G03A – ХОРМОНСКИ КОНТРАЦЕПТИВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
G03AA07	левоноргестрел, етинилестрадиол ²²	филм – таблете	(015+0,03)mg
ИНДИКАЦИЈЕ	22 – Хормонска контрацепција (Z30) уз препоруку гинеколога или ендокринолога		
G03D – ПРОГЕСТЕРОНИ			
G03DA04	прогестерон ²³	капсула, мека	100 mg
G03DB01	дидрогестерон ²³	филм-таблете	10 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	23 - Пријетећи побачај. Превенција понављаних побачаја узрокованих недовољним лучењем прогестерона. Опасност од пријевременог порођаја. У поступку процедуре вантјелесне оплодње. Лијек се уводи у терапију по препоруци гинеколога.		

Н – ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНСУЛИНЕ			
Н01 – ХОРМОНИ ХИПОФИЗЕ И ХИПОТАЛАМУСА И АНАЛОЗИ			
Н01А – ХОРМОНИ ПРЕДЊЕГ РЕЖЊА ХИПОФИЗЕ И АНАЛОЗИ			
Н01АС01	соматропин ²⁴	инјекција, прашак и растварач за раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом пену	10 mg/1,5ml; 5,3mg/ml; 12mg/ml
Н01АС08	соматрогон ²⁵	отопина за инјекцију у напуњеној бризгалици	24mg/1,2ml; 60mg/1,2ml
Н01В – ХОРМОНИ ЗАДЊЕГ РЕЖЊА ХИПОФИЗЕ			
Н01ВА02	дезмопресин	таблете спреј за нос	0,2 mg 10 mcg /0,1ml
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>24 – Хипопитуитаризам (E23.0). - Турнеров синдром (Q96). - Као супституциона терапија код младих особа са урођеним или стеченим дефицитом хормона раста.</p> <p>25 – За лијечење дјецe у доби од 3 до 18 година који имају поремећај у расту узрокован недовољним излучивањем хормона раста. Лијек се уводи у терапију по препоруци ендокринолога.</p>		
Н02 – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
Н02А – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, МОНОКОМПОНЕНТНИ			
Н02АВ07	преднизон	таблете	5 mg; 20 mg
Н02АВ09	хидрокортизон ²⁶	таблете	10mg; 20 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	26 – Sheehanov синдром (E23), Morbus Adison (E27.1).		
Н03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ТИРЕОИДЕЈЕ (ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ)			
Н03А – ПРЕПАРАТИ ТИРЕОИДЕЈЕ			
Н03АА01	левотироксин – натријум	таблете	0,100 mg
Н03В – АНТИТИРЕОИДНИ ЛИЈЕКОВИ			
Н03ВА02	пропилтиоурацил ²⁷	таблете	50 mg; 100 mg
Н03ВВ02	тиамазол	таблете	20 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	27– Хипертиреоза у трудноћи (O99.2) и хипертиреоза код дојиља		
Н04 – ПАНКРЕАСНИ ХОРМОНИ (ХОРМОНИ ГУШТЕРАЧЕ)			
Н04А – ГЛИКОГЕНОЛИТИЧКИ ХОРМОНИ			
Н04АА01	глукагон	раствор за ињекцију	1 mg (i.i.)
Н05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ХОМЕОСТАЗЕ КАЛЦИЈУМА			
Н05А – ПАРАТИРОИДНИ ХОРМОНИ И АНАЛОЗИ			
Н05АА02	терипаратид ²⁸	раствор за инјекцију у улошку	20mcg/80mcl
ИНДИКАЦИЈЕ	28 – Код особа са тешком остеодензитометријски доказаном остеопорозом (BMD преко 3,5). За особе са остеопоротским преломом кичме односно кука потврђеним од стране одговарајућег специјалисте. За секундарну		

	превенцију остеопоротичних прелома код пацијената у постменопаузи које су имале бар један прелом узрокован траумом уз верификовану остеопорозу. Лијек се уводи у терапију по препоруци три доктора медицине специјалиста различитих грана медицине од наведених: реуматологије, ендокринологије, ортопедије, физијатрије.		
J – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J01 – АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J01A – ТЕТРАЦИКЛИНИ			
J01AA02	доксициклин	капсуле, филм-таблете	100 mg
J01C – БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБИОТИЦИ, ПЕНИЦИЛИНИ			
J01CA04	амоксицилин	капсуле	500 mg
		прашак за оралну суспензију	250 mg/5ml
J01CE02	феноксиметилпеницилин	орална суспензија	750 000 i.j./5ml
		прашак за орални раствор	250mg/5ml
		филм-таблете	1000 000i.j.; 1500 000i.j.
J01D – ОСТАЛИ БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ			
J01DB01	цефалексин	капсуле	500 mg
		прашак за оралну суспензију	250 mg/5ml
J01E – СУЛФОНАМИДИ И ТРИМЕТОПРИМ			
J01EE01	сулфаметоксазол, триметоприм	таблете	400 mg + 80 mg
		сируп	(200 + 40) mg/5ml
J01F – МАКРОЛИДИ, ЛИНКОЗАМИДИ И СТРЕПТОГАМИНИ			
J01FA01	еритромицин	филм-таблете	500 mg
J02 – АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J02A – АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J02AC01	флуконазол ²⁹	капсуле	50 mg; 100 mg; 150 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	29 – Наставак болничког лијечења уз ограничење примјене до 21 дан		
J05 – АНТИВИРУСНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
J05A – ЛИЈЕКОВИ СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА ВИРУСЕ			
J05AB01	ацикловир ³⁰	таблете	200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	30 – За пацијенте који су имунодефицијентни уз индикацију: карцином (C00-C97), хепатитис (B15-B19), HIV/AIDS (B20-B24); за пацијенте који су на терапији кортикостероидима дуже од мјесец дана		
J05AF05	ламивудин ³¹	филм-таблете	100 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	31 – Хронични хепатитис Б (B18.1)		
L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ			
L02 – ЕНДОКРИНОЛОШКА ТЕРАПИЈА			
L02B – ХОРМОНСКИ АНТАГОНИСТИ И СРОДНИ ЛИЈЕКОВИ			
L02BA01	тамоксифен	таблете	10 mg
L02BB03	бикалутамид ³²	филм-таблете	50 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	32 – Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (C61) уз препоруку специјалисте онколога.		

L02BG03	анастрозол ³³	филм-таблете	1 mg
L02BG06	ексеместан ³³	обложене таблете	25 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	33– Лијечење хормонски зависног метастатског карцинома дојке (C50) након неуспјеха терапије са тамоксифеном или контраиндикације за тамоксифен код постменопаузалних жена уз препоруку специјалисте онколога.		
L02BG04	летрозол	таблете	2,5 mg
L04 – ИМУНОСУПРЕСИВИ			
L04A – ИМУНОСУПРЕСИВИ			
L04AA06	микофенолна киселина ³⁴	капсуле	250 mg
		гастрорезистентне таблете	180 mg; 360 mg
L04AD01	циклоспорин ³⁴	капсуле	25 mg; 50 mg; 100mg
		орални раствор	100 mg/ml; 50ml
L04AD02	такролимус ³⁴	капсуле	0,5 mg; 1 mg; 5 mg
		тврда капсула са продуженим ослобађањем	0,5 mg; 1 mg; 3 mg; 5 mg
L04AX01	азатиоприн ³⁴	таблете, филм-таблете	50 mg
L04AX03	метотрексат	таблете	2,5 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	34 – Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција (N18), трансплантација (Z94).		
M – МИШИЋНО – КОШТАНИ СИСТЕМ			
M01 – АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ			
M01A – НЕСТЕРОИДНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ			
M01AE01	ибупрофен	сируп ³⁵	100 mg/5ml
		филм-таблете, дражеје	400 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	35 – За дјецу и лица са поремећеним актом гутања		
M04 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА			
M04A – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА			
M04AA01	алопуринол	таблете	100 mg
N – НЕРВНИ СИСТЕМ			
N02 – АНАЛГЕТИЦИ			
N02A – ОПИОИДИ			
N02AA01	морфин ³⁶	сируп	10mg/5ml
		оралне капи	20mg/ml
N02AA55	оксикодон, налоксон ³⁷	таблете са продуженим ослобађањем	2,5mg+5mg 5mg+10mg 10mg+20mg 20mg+40mg
N02AB03	фентанил ³⁶	трансдермални фластер	50 mcg/h(8,4mg/21 cm ² , 5mg/20 cm ²) 25 mcg/h(4,2mg/10,5cm ² , 2,5mg/10 cm ²) 100 mcg/h(23,12mg/42 cm ² , 10mg/ 40 cm ²)
N02AE01	бупренорфин ³⁶	трансдермални	35 mcg/h

		пластер	52,5 mcg/h
N02AX02	трамадол ³⁶	капсуле	50 mg
		филм-таблете	100 mg
		оралне капи,раствор	100 mg/ml
N02B – ОСТАЛИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТИПИРЕТИЦИ			
N02BE01	парацетамол	сируп	120 mg/5ml
		суполиторије	200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>36 – За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв. Трећој аналгетичкој степеници (C00 – C97) на препоруку специјалисте онколога. Након што су исцрпљене друге фармакотерапијске могућности у лијечењу бола, а на препоруку специјалисте неуролога или анестезиолога, у терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична неуралгија)(M79.2), постхерпетичке неуралгије(G53.0), тригеминалне неуралгије(G50.0) дијабетичке амиотрофије (G73.0), болних поремећаја оптичког нерва(H47.0), каузалгије(G56.4),спондилодисцитиса (M50.1 и M51.1),дерматополиомиозитиса(M33.0) и посттрауматске неуралгије.</p> <p>37 - За лијечење умјерено јаког до јаког хроничног бола код болесника са малигним обољењем (C00-C97) на препоруку онколога.</p>		
N03 – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ			
N03A - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ			
N03AA02	фенобарбитон	таблете	100 mg
N03AE01	клоназепам	таблете	0,5mg; 2 mg
N03AF01	карбамазепин	таблете	200 mg
		таблете са продуженим ослобађањем	400 mg
N03AF02	окскарбамазепин	орална суспензија	60 mg/ml
		филм-таблете	300 mg; 600 mg
N03AG01	натријум – валпроат	таблете са продуженим ослобађањем	300 mg; 500 mg
		гастрорезистентне таблете	150mg; 300 mg
		сируп	57,64mg/1ml
N03AX09	ламотригин	таблете	25 mg;50 mg;100 mg
		таблете за жвакање	5 mg
N03AX11	топирамат ³⁸	таблете	25 mg;50 mg;100 mg
N03AX14	леветирацетам ³⁹	филм-таблете	250 mg;500 mg; 1000 mg
		орални раствор	100mg/1ml
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>38 – За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или неуролога/неуропсихијатра.</p> <p>39 – Епилепсија (G40).</p>		
N04 – АНТИПАРКИНСОНИЦИ			
N04A – АНТИХОЛИНЕРГИЦИ			
N04AA02	бипериден	таблете	2 mg
N04B – ДОПАМИНЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ			
N04BA02	леводопа, бензеразид	таблете	100 mg + 25 mg
N04BC01	бромокриптин	таблете	2,5 mg
N04BC04	ропинирол ⁴⁰	филм-таблете	0,25mg;1mg;2mg
		таблете са	2 mg; 4 mg; 8 mg

		продуженим ослобађањем	
N04BC05	прамипексол ⁴⁰	таблете са продуженим ослобађањем	0,26mg; 0,52mg; 1,05mg
ИНДИКАЦИЈЕ	40 – Само за лијечење узнапредовалог стадијума Паркинсонове болести (G20), по препоруци неуролога		
N05 – ПСИХОЛЕПТИЦИ			
N05A – АНТИПСИХОТИЦИ			
N05AA01	хлоропромазин	таблете	25 mg
N05AB02	флуфеназин	обложене таблете	2,5 mg; 5 mg
N05AD01	халоперидол	таблете	2 mg; 10 mg
N05AH02	клозапин	таблете	25 mg; 100 mg
N05AH03	оланзапин	филм-таблете, распадљиве таблете за уста	5 mg; 10 mg
N05B – АНКСИОЛИТИЦИ			
N05BA01	диазепам ⁴¹	таблете	10 mg
ИНДИКАЦИЈЕ	41 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29)		
N05BA12	алпразолам	таблете	0,5mg; 1mg
N06 – ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ			
N06A – АНТИДЕПРЕСИВИ			
N06AA09	амитриптилин	филм-таблете	10 mg; 25 mg
N07 – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ			
N07A - ПАРАСИМПАТОМИМЕТИЦИ			
N07AA02	пиродостигмин	филм-таблете	60 mg
N07B – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ			
N07BC01	бупренорфин ⁴²	сублингвалне таблете	2mg; 8mg
N07BC02	метадон ⁴²	оралне капи,раствор	10 mg/ml
		таблете	5 mg
N07BC51	бупренорфин, налоксон ⁴²	сублингвалне таблете	(2+0,5)mg (8+2)mg
ИНДИКАЦИЈЕ	42 - За супституцијску терапију зависника од опојних дрога (F11), на препоруку специјалисте психијатра из здравствених установа које су одређене посебним актом директора Фонда.		
P – АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ			
P01 – АНТИПРОТОЗОИЦИ			
P01A – АМЕБИЦИДИ И ДРУГИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ СУ ИЗАЗВАНЕ ПРОТОЗОАМА			
P01AB01	метронидазол	филм-таблете	400 mg
		таблете	250 mg
P01B - АНТИМАЛАРИЦИ			
P01BA02	хидроксихлорохин	филм-таблете	200 mg
P02 – АНТИХЕЛМИНТИЦИ			
P02C – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ НЕМАТОДА			
P02CA01	мебендазол	орална суспензија	100 mg/5ml
R – РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ			

R03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ			
R03A – АДРЕНЕРГИЦИ, ИНХАЛАЦИОНИ			
R03AC02	салбутамол	инхалациони раствор за распршивач	5 mg/ml
		инхалациона суспензија за распршивач	100 mcg/доза
R03AC13	формотерол ⁴³	прашак за инхалирање, тврда капсула	12 mcg/1 капсула
R03AC18	индакатерол ⁴³	прашак за инхалацију, тврда капсула	150 mcg
R03AK06	салметерол, флутиказон ^{44,45}	инахалациона суспензија за распршивач	(25 + 250) mcg/1 доза (25 + 125) mcg/1 доза (25 + 50) mcg/1 доза
		прашак за инхалацију	(50 + 250) mcg/1 доза (50 + 100) mcg/1 доза (50 + 500) mcg/1 доза
R03AK08	беклометазон, формотерол ^{44,45}	стлчени инхалат, раствор	(100+6) mcg/инхалацији
R03AK07	будесонид, формотерол ^{44,45}	прашак инхалата	(160+4,5) mcg/дозе (320+9) mcg/дозе
R03AK10	флутиказон фураат, вилантерол	прашак за инхалацију, подијелени	92/22 mcg ^{44,45}
			184/22 mcg ⁴³
R03AK14	индакатерол, мометазон ⁴⁴	прашак за инхалацију, тврда капсула	125mcg/1капсула+127,5 mcg/1капсула
R03AL04	индакатерол, гликопиронијум бромид ⁴³	прашак за инхалацију, тврда капсула	(85+43) mcg/дозе
R03AL05	аклидинијум бромид, формотерол ⁴³	прашак за инхалацију	(396+11,8)mcg/дозе
R03AL09	беклометазон, формотерол, гликопиронијум бромид ⁴⁶	стлчени инхалат, отопина	(87+5+9) mcg/дозе
ИНДИКАЦИЈЕ	43 –ХОПБ (J44) 44 – Астма (J45) 45 - Стадијум Ц ХОПБ (J44), Стадијум Д ХОПБ (J44) 46 - Код одраслих болесника са умјереним до тешким обликом ХОПБ (J44)		
R03B – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ, ИНХАЛАЦИОНИ			
R03BA05	флутиказон	инхалациона суспензија за распршивач	50 mcg/1 доза 125 mcg/1 доза 250 mcg/1 доза
R03BB04	тиотропијум ⁴⁷	прашак за инхалацију у тврдој капсули	0,018 mg
		раствор за инхалацију	2,5mcg/дозе
		прашак за инхалацију у тврдој капсули	10mcg/дозе
R03BB05	аклидинијум ⁴⁷	прашак за инхалацију	322mcg/дозе
R03BB06	гликопиронијум бромид ⁴⁷	прашак за инхалацију, тврда	44 mcg

		капсула	
ИНДИКАЦИЈА	47 – ХОПБ (J44)		
R03C – АДРЕНЕРГИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
R03CC02	салбутамол	сируп таблете	2 mg/5ml 2 mg
R03D – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ У ТЕРАПИЈИ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ			
R03DA05	аминофилин	таблете са продуженим ослобађањем	350 mg
R05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ КАШЉА И ПРЕХЛАДЕ			
R05C – ЕКСПЕКТОРАНСИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА АНТИТУСИЦИМА			
R05CB13	дорназа алфа ⁴⁸	раствор за распршивање	1mg/1ml
ИНДИКАЦИЈА	48 – Цистична фиброза (E48)		
R06 – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
R06A – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ			
R06AX13	лоратадин ⁴⁹	сируп	5 mg/5ml
R06AX27	деслоратадин ⁵⁰	сируп	0,5 mg/ml
ИНДИКАЦИЈЕ	49 – За дјецу до 15 година и особе са поремећеним актом гутања. 50 – Хронични ринитис, назофарингитис и фарингитис (J31) за дјецу до 15 година и особе са поремећеним актом гутања		
S – СЕНЗОРНИ ОРГАНИ			
S01 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ОКА			
S01C – АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ И АНТИИНФЕКТИВИ У КОМБИНАЦИЈИ			
S01CA01	дексаметазон,неомицин	капи за очи и уши	(1,0 + 3,5) mg/ml
S01E – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГЛАУКОМА И МИОТИЦИ			
S01EC04	бринзоламид	капи за очи	1%
S01ED01	тимолол	капи за очи,раствор	5 mg/ml
V - ОСТАЛО			
V03 – ОСТАЛИ НЕРАЗВРСТАНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРОИЗВОДИ			
V03A – ОСТАЛИ НЕРАЗВРСТАНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРОИЗВОДИ			
V03AE03	лантан карбонат	орални прашак	1000 mg
V06 – ОПШТИ НУТРИЕНТИ			
V06AC01	дијететски препарат(РАМ I,II,III)	прашак	
V06DX02	безглутенско брашно ⁵¹		
V06DX01	дијететски препарат ^{52,56}	прашак, течност	
V06DX03	дијететски препарат за ентералну примјену ^{53,56}	течност	
V06DX	дијететски препарат – храна за посебне медицинске намјене ^{54,55,56}	прах, течност	
ИНДИКАЦИЈЕ	51 – Целијакија (K90.0). 52 – Само за пацијенте обољеле од фенилкетонурије (E70) и хиперамонијемиије (E72.2). Глутарна ацидурија. Болест урина мириса јаворовог сирупа (MSUD). 53 – АЛС (G12.2). Лафорина болест. Pelizeaus – Merzbacher-ова болест. Rett-ов синдром (F84.1). Ментална ретардација X - везана тип 3 (F71.1). Vaten-ова болест (E75.4). Глутарна ацидурија, Edwards-ов синдром. Мукополисахаридоза тип II (Хантеров синдром) – E76.1		

	<p>54 - Интолеранција протеина крављег млијека. Мултипла алергија на храну. Netherton – ов синдром (Q80.9). По препоруци педијатра.</p> <p>55 – Код алергије на протеине крављег млијека, по препоруци педијатра.</p> <p>56 – За лица обољела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести.</p>
--	---